

## トマトキバガに対しては 以下の農薬を使用して防除を行ってください。

以下に記載した農薬はトマトキバガに対して登録はありませんが、植物防疫法第29条第1項の規定による防除を行うために使用が可能です。

また、使用にあたっては購入した農薬の適用作物、使用方法、使用時期、散布液量、希釈倍数使用量、使用回数を守ることで、出荷停止等、流通に支障が出ることもありません。

なお、マルハナバチなどに影響のある農薬も含まれるため、農薬の選定に当たっては十分注意してください。

### ○ トマト

| 農薬の種類                                                | 使用方法               | 希釈倍数<br>使用量                                                           | 使用時期           | 散布液量         | 本剤の<br>使用回数 | RAC<br>コード     | 系統名                                       | テウ目<br>登録 | ハモグリバ<br>登録 |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------------------------------------|-----------|-------------|
| アクリナトリン・スピロメ<br>シフェン水和剤                              | 散布                 | 2000倍                                                                 | 収穫前日まで         | 100～300L/10a | 2回以内        | 3A<br>23       | ピレスロイド系<br>ピレトリン系<br>テトロン酸及びテトラ<br>ミン酸誘導体 | ○         | -           |
| アクリナトリン水和剤                                           | 散布                 | 1000倍                                                                 | 収穫前日まで         | 150～300L/10a | 3回以内        | 3A             | ピレスロイド系<br>ピレトリン系                         | ○         | -           |
| イソキサチオン粉剤                                            | 土壌表面散布土<br>壌混和処理   | 6kg/10a                                                               | は種時又は植付<br>時   |              | 2回以内        | 1B             | 有機リン系                                     | ○         | -           |
| インドキサカルブ水和剤                                          | 散布                 | 2000倍                                                                 | 収穫前日まで         | 100～300L/10a | 2回以内        | 22A            | オキサジアジン系                                  | ○         | -           |
| エマメクテン安息香酸塩・<br>ルフエヌロン水和剤                            | 散布                 | 1500倍                                                                 | 収穫前日まで         | 100～300L/10a | 2回以内        | 6<br>15        | アベルメクテン系<br>ミルベマイシン系<br>ベンゾイル尿素系          | ○         | ○           |
| エマメクテン安息香酸塩乳<br>剤                                    | 散布                 | 2000倍                                                                 | 収穫前日まで         | 100～300L/10a | 5回以内        | 6              | アベルメクテン系<br>ミルベマイシン系                      | ○         | ○           |
| クロマフェノジド水和剤                                          | 散布                 | 1000～2000倍                                                            | 収穫前日まで         | 100～300L/10a | 3回以内        | 18             | ジアシルヒドラジン<br>系                            | ○         | -           |
| クロラントリニブロール<br>水和剤                                   | 散布                 | 2000倍                                                                 | 収穫前日まで         | 100～300L/10a | 3回以内        | 28             | ジアミド系                                     | ○         | ○           |
| クロラントリニブロール<br>粒剤                                    | 株元散布               | 1g/株                                                                  | 育苗期後半～定<br>植時  |              | 1回          | 28             | ジアミド系                                     | ○         | ○           |
| クロルフェナビル水和剤                                          | 散布                 | 2000倍                                                                 | 収穫前日まで         | 100～300L/10a | 3回以内        | 13             | ピロール系<br>ジニトロフェノール系<br>スルフルラミド            | ○         | ○           |
| クロルフルアズロン乳剤                                          | 散布                 | 2000倍                                                                 | 収穫前日まで         | 100～300L/10a | 3回以内        | 15             | ベンゾイル尿素系                                  | ○         | -           |
| シアントラニブロール・<br>チアメトキサム粒剤                             | 株元散布               | 2g/株                                                                  | 鉢上げ時～育苗<br>期後半 |              | 1回          | 28<br>4A       | ジアミド系<br>ネオニコチノイド系                        | ○         | ○           |
| シアントラニブロール水<br>和剤                                    | 散布                 | 2000～4000倍                                                            | 収穫前日まで         | 100～300L/10a | 3回以内        | 28             | ジアミド系                                     | ○         | ○           |
| スピネトラム水和剤                                            | 散布                 | 2500～5000倍                                                            | 収穫前日まで         | 100～300L/10a | 2回以内        | 5              | スピノシン系                                    | ○         | ○           |
| スピノサド水和剤                                             | 散布                 | 5000倍                                                                 | 収穫前日まで         | 100～300L/10a | 2回以内        | 5              | スピノシン系                                    | ○         | ○           |
| ダイアジノン粒剤                                             | 土壌混和               | 6～9kg/10a                                                             | は種時又は植付<br>時   |              | 2回以内        | 1B             | 有機リン系                                     | ○         | -           |
| ダイアジノン粒剤                                             | 全面土壌混和又は<br>作業土壌混和 | 4～6kg/10a                                                             | は種時又は定植<br>時   |              | 2回以内        | 1B             | 有機リン系                                     | ○         | -           |
| テトラニブロール水和剤                                          | 散布                 | 2500～5000倍                                                            | 収穫前日まで         | 100～300L/10a | 3回以内        | 28             | ジアミド系                                     | ○         | ○           |
| テフルベンズロン乳剤                                           | 散布                 | 2000倍                                                                 | 収穫前日まで         | 100～300L/10a | 2回以内        | 15             | ベンゾイル尿素系                                  | ○         | -           |
| ノバルロン乳剤                                              | 散布                 | 2000～3000倍                                                            | 1番花の開花まで       | 100～300L/10a | 4回以内        | 15             | ベンゾイル尿素系                                  | ○         | ○           |
| ピリダリル水和剤                                             | 散布                 | 1000倍                                                                 | 収穫前日まで         | 100～300L/10a | 2回以内        | UN             |                                           | ○         | ○           |
| フルキサメタミド乳剤                                           | 散布                 | 2000倍                                                                 | 収穫前日まで         | 100～300L/10a | 2回以内        | 30             | メタジアミド系<br>イソオキサゾリン系                      | ○         | ○           |
| フルフェノクスロン乳剤                                          | 散布                 | 2000～4000倍                                                            | 収穫前日まで         | 100～300L/10a | 4回以内        | 15             | ベンゾイル尿素系                                  | ○         | ○           |
| フルベンジアミドくん煙剤                                         | くん煙                | くん煙室容積<br>400m <sup>3</sup> (床面積200<br>m <sup>2</sup> ×高さ2m)当り<br>50g | 収穫前日まで         |              | 2回以内        | 28             | ジアミド系                                     | ○         | -           |
| フルベンジアミド水和剤                                          | 散布                 | 2000～4000倍                                                            | 収穫前日まで         | 100～300L/10a | 2回以内        | 28             | ジアミド系                                     | ○         | -           |
| ベルメトリン粒剤                                             | 株元散布               | 3kg/10a                                                               | 生育初期           |              | 3回以内        | 3A             | ピレスロイド系<br>ピレトリン系                         | ○         | -           |
| メタフルミゾン水和剤                                           | 散布                 | 1000～2000倍                                                            | 収穫前日まで         | 100～300L/10a | 3回以内        | 22B            | セミカルバゾン系                                  | ○         | -           |
| メトキシフェノジド水和剤                                         | 散布                 | 2000～4000倍                                                            | 収穫前日まで         | 100～300L/10a | 2回以内        | 18             | ジアシルヒドラジン<br>系                            | ○         | -           |
| ルフエヌロン乳剤                                             | 散布                 | 2000～3000倍                                                            | 収穫前日まで         | 100～300L/10a | 4回以内        | 15             | ベンゾイル尿素系                                  | ○         | ○           |
| レピメクテン乳剤                                             | 散布                 | 2000倍                                                                 | 収穫前日まで         | 100～300L/10a | 3回以内        | 6              | アベルメクテン系<br>ミルベマイシン系                      | ○         | ○           |
| 還元澱粉糖化物・クロチア<br>ニジン・ピリダリル・ベル<br>メトリン・マンデストロピ<br>ン水和剤 | 散布                 | 原液                                                                    | 収穫前日まで         |              | 2回以内        | 4A<br>3A<br>UN | ネオニコチノイド系<br>・ピレスロイド系<br>ピレトリン系           | ○         | -           |
| 脂肪酸グリセリド・スピノ<br>サド水和剤                                | 散布                 | 1000倍                                                                 | 収穫前日まで         | 100～300L/10a | 2回以内        | 5              | スピノシン系                                    | ○         | ○           |

○ ミニトマト

| 農薬の種類                     | 使用方法             | 希釈倍数<br>使用量 | 使用時期           | 散布液量         | 本剤の<br>使用回数 | RAC<br>コード | 系統名                                       | チョウ目<br>登録 | ハモグリバ<br>登録 |
|---------------------------|------------------|-------------|----------------|--------------|-------------|------------|-------------------------------------------|------------|-------------|
| アクリナトリン・スピロメ<br>シフェン水和剤   | 散布               | 2000倍       | 収穫前日まで         | 100～300L/10a | 2回以内        | 3A<br>23   | ピレスロイド系<br>ピレトリン系<br>テトロン酸及びテトラ<br>ミン酸誘導体 | ○          | -           |
| アクリナトリン水和剤                | 散布               | 1000倍       | 収穫前日まで         | 150～300L/10a | 2回以内        | 3A         | ピレスロイド系<br>ピレトリン系                         | ○          | -           |
| イソキサチオン粉剤                 | 土壌表面散布土<br>壌混和処理 | 6kg/10a     | は種時又は植付<br>時   |              | 2回以内        | 1B         | 有機リン系                                     | ○          | -           |
| エマメクテン安息香酸塩・<br>ルフェスロン水和剤 | 散布               | 1500倍       | 収穫前日まで         | 100～300L/10a | 2回以内        | 6<br>15    | アベルメクテン系<br>ミルベマイシン系<br>ベンゾイル尿素系          | ○          | ○           |
| エマメクテン安息香酸塩乳<br>剤         | 散布               | 2000倍       | 収穫前日まで         | 100～300L/10a | 5回以内        | 6          | アベルメクテン系<br>ミルベマイシン系                      | ○          | ○           |
| クロマフェノジド水和剤               | 散布               | 1000～2000倍  | 収穫7日前まで        | 100～300L/10a | 3回以内        | 18         | ジアシルヒドドラジン<br>系                           | ○          | -           |
| クロラントリニブロール<br>水和剤        | 散布               | 2000倍       | 収穫前日まで         | 100～300L/10a | 3回以内        | 28         | ジアミド系                                     | ○          | ○           |
| クロルフェナビル水和剤               | 散布               | 2000倍       | 収穫前日まで         | 100～300L/10a | 3回以内        | 13         | ピロール系<br>ジニトロフェノール系<br>スルフルアミド            | ○          | ○           |
| クロルフルアズロン乳剤               | 散布               | 2000倍       | 収穫前日まで         | 100～300L/10a | 3回以内        | 15         | ベンゾイル尿素系                                  | ○          | -           |
| シアントラニブロール・<br>チアメトキサム粒剤  | 株元散布             | 2g/株        | 鉢上げ時～育苗<br>期後半 |              | 1回          | 28<br>4A   | ジアミド系<br>ネオニコチノイド系                        | ○          | ○           |
| シアントラニブロール水<br>和剤         | 散布               | 2000～4000倍  | 収穫前日まで         | 100～300L/10a | 3回以内        | 28         | ジアミド系                                     | ○          | ○           |
| スピネトラム水和剤                 | 散布               | 2500～5000倍  | 収穫前日まで         | 100～300L/10a | 2回以内        | 5          | スピノシン系                                    | ○          | ○           |
| スピノサド水和剤                  | 散布               | 5000倍       | 収穫前日まで         | 100～300L/10a | 2回以内        | 5          | スピノシン系                                    | ○          | ○           |
| テトラニブロール水和剤               | 散布               | 2500～5000倍  | 収穫前日まで         | 100～300L/10a | 3回以内        | 28         | ジアミド系                                     | ○          | ○           |
| テフルベンズロン乳剤                | 散布               | 2000倍       | 収穫前日まで         | 100～300L/10a | 2回以内        | 15         | ベンゾイル尿素系                                  | ○          | -           |
| ノバルロン乳剤                   | 散布               | 2000～3000倍  | 1番花の開花まで       | 100～300L/10a | 4回以内        | 15         | ベンゾイル尿素系                                  | ○          | ○           |
| ピリダリル水和剤                  | 散布               | 1000倍       | 収穫前日まで         | 100～300L/10a | 2回以内        | UN         |                                           | ○          | ○           |
| フルキサメタミド乳剤                | 散布               | 2000倍       | 収穫前日まで         | 100～300L/10a | 2回以内        | 30         | メタジアミド系<br>イソオキサゾリン系                      | ○          | ○           |
| フルフェノクスロン乳剤               | 散布               | 2000～4000倍  | 収穫前日まで         | 100～300L/10a | 2回以内        | 15         | ベンゾイル尿素系                                  | ○          | ○           |
| フルベンジアミド水和剤               | 散布               | 2000～4000倍  | 収穫前日まで         | 100～300L/10a | 2回以内        | 28         | ジアミド系                                     | ○          | -           |
| ベルメトリン粒剤                  | 株元散布             | 3kg/10a     | 生育初期           |              | 1回          | 3A         | ピレスロイド系<br>ピレトリン系                         | ○          | -           |
| メタフルミゾン水和剤                | 散布               | 1000～2000倍  | 収穫前日まで         | 100～300L/10a | 3回以内        | 22B        | セミカルバゾン系                                  | ○          | -           |
| ルフェスロン乳剤                  | 散布               | 2000～3000倍  | 収穫前日まで         | 100～300L/10a | 2回以内        | 15         | ベンゾイル尿素系                                  | ○          | ○           |
| レピメクテン乳剤                  | 散布               | 2000倍       | 収穫前日まで         | 100～300L/10a | 3回以内        | 6          | アベルメクテン系<br>ミルベマイシン系                      | ○          | ○           |
| 脂肪酸グリセリド・スピノ<br>サド水和剤     | 散布               | 1000倍       | 収穫前日まで         | 100～300L/10a | 2回以内        | 5          | スピノシン系                                    | ○          | ○           |